花芙蓉の一種として扱うなど誤解されているので，来歴を明らかにし，ヒトエスイフヨウ cv. *Hitoesuihuyō*（Corolla simple, then pink）と呼ぶことにしたい．白花芙蓉と普通の芙蓉との間にできた一つの品種である．

（東京都中野区[redacted]）

ムラサキイワベンケイと *Orostachys aliciae*（ベンケイソウ科）の種内分類群の学名新組合せ（大場秀章）．

Hideaki Ohba: New Infraspecific Names in *Rhodiola integrifolia* Raf. and *Orostachys aliciae* (Raym.-Hamet) H.Ohba (Crassulaceae).

In preparation of *Synopsis Plantarum Succulentum* by International Organization for Succulent Plant Study, it becomes necessary to propose the following three infraspecific names in *Rhodiola integrifolia* and one in *Orostachys aliciae*.

1) *Rhodiola integrifolia* Raf., Atlantic J. and Friend of Knowledge **1**: 146 (1832).

Subsp. **leedyi** (Rosend. & J. W. Moore) H. Ohba, comb. nov.

Sedum rosea (L.) Scop. var. *leedyi* Rosend. & J. W. Moore in Rhodora **49**: 198 (1947).

Sedum integrifolium (Raf.)A. Nelson subsp. *leedyi* (Rosend. & J. W. Moore) R. T. Clausen, *Sedum* of N Amer.: 502 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. leedyi (Rosend. & J. W. Moore) A. Löve & D. Löve in Taxon **34**: 163 (1985).

Type: N America. Minnesota: Olmstead Co., North Branch of Root River opposite Herman McDaniel farm about 5km south of Simpson. John L. Leedy on July 12, 1942 (MIN).

Subsp. **neomexicana** (Britton) H. Ohba, comb. nov.

Rhodiola neomexicana Britton in Bull. New York Bot. Gard. **3**(9): 38 (1903).

Sedum rosea (L.) Scop. var. *neomexicanum* (Britton) A. Berger in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **18**a: 440 (1930).

Sedum integrifolium (Raf.) A. Nelson subsp. *neomexicanum* (Britton) R. T. Clausen, *Sedum* of N Amer.: 509 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. *neomexicana* (Britton) A. Löve & D. Löve in Taxon **34**: 163 (1985).

Type: N America. New Mexico: Lincoln Co., White Mountain Peak, alt. 3500m. E. O. Wooton on Aug. 1, 1930 (NY).

Subsp. **procera** (R. T. Clausen) H. Ohba, comb. nov.

Sedum integrifolium (Raf.) A. Nelson subsp. *procerum* R. T. Clausen, *Sedum* of N Amer.: 506 (1975).

Tolmacheva integrifolia (Raf.) A. Löve & D. Löve subsp. *procera* (R. T. Clausen) A. Löve & D. Löve in Taxon **34**: 164 (1985).

Type: N America. Colorado: San Juan Co., Southern Rocky Mountains, N of Silverton, Bonita Peak, alt. 3932m. R. T. Clausen No. 62-69 (BH [CU]).

2) *Orostachys aliciae* (Raym.-Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, Bot. **12**: 160 (1978).

Var. **komarovii** (Raym.-Hamet) H. Ohba, comb. nov.

Sedum aliciae Raym.-Hamet var. *komarovii* Raym.-Hamet in J. Russ. Bot. 1912: 175 (1912).

Kungia aliciae (Raym.-Hamet) K. T. Fu var. *komarovii* (Raym.-Hamet) K. T. Fu in J. N.-W. Teach. Coll. (Nat. Sci.) Special Issue **1**: 5 (1988).

Type: China. Szechuan. Potanin s. n. in 1893 (LE).

国際多肉植物研究機構が編集出版を企画している *Synopsis Plantarum Succulentum* を執筆中に未発表のムラサキイワベンケイの3亜種名と *Orostachys aliciae* の1変種名を用いる必要が生じたために，ここにそれらを提唱した．前者の3亜種はいずれも北米産のもので，亜種の分布，区別点は R. T. Clausen (1975) *Sedum of North America* に詳しく解説されている．後者は中国四川省に特産する．

（東京大学総合研究博物館）